

【超重要】以下の経口糖尿病薬(ピグアナイド系)は、ヨード造影剤投与前後2日間(合計5日間)要休薬

成分名	医薬品名	製剤写真	医薬品名	製剤写真
メトホルミン塩酸塩	メトグルコ錠250mg		メトグルコ錠500mg	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TCK」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TCK」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーフ」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーフ」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ファイザー」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 後発品	
	メトホルミン塩酸塩 【高用量適応なし】	グリコラン錠250mg		メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーフ」 後発品
メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 後発品				
メトホルミン塩酸塩 +ピオグリタゾン塩酸塩	メタクト配合錠LD		メタクト配合錠HD	
メトホルミン塩酸塩 +ビルダグリブチン	エクメット配合錠LD		エクメット配合錠HD	
メトホルミン塩酸塩 +アログリブチン	イニシク配合錠			
メトホルミン塩酸塩 +アナグリブチン	メトアナ配合錠LD		メトアナ配合錠HD	
ブホルミン塩酸塩	ジベトス錠50mg 後発品		ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 後発品	