

アズレン, リドカインを使用した含嗽液

【Rp】アズノール [®] うがい液 4%	5 プッシュ (=0.5mL)
キシロカイン [®] 液「4%」	2mL [*])
グリセリン(JP)	60mL
滅菌精製水(JP)	適量
全量 500mL	

【原料薬品】アズノール [®] うがい液 4%	日本点眼薬研究所＝日本新薬
キシロカイン [®] 液「4%」	アスペンジャパン
グリセリン(JP)	日医工
滅菌精製水(JP)	光製薬

【調製法】

- ① 500mL 褐色ポリ水薬びんにアズノール[®]うがい液 4%を取り, 適量の滅菌精製水を加えて, 溶解する.
- ② ①に残りの薬品を入れ, 振盪混和し, 滅菌精製水にて全量 500mL とする.

【性状】 淡青紫色の粘性の液で, 芳香がある

【保存】 遮光・冷所

【使用期限】 1ヶ月(用時調製)

【容器】 500mL 褐色ポリ水薬びん

【適応】 口腔乾燥症(ドライマウス), 口内炎・舌痛症等の口腔洗浄・除痛

【用法・用量】 用時振盪, 1回10mL, 1日3～6回うがいをし, 吐き出す

【服薬指導】 患者用説明文書を添付

【備考】 *): キシロカイン[®]液「4%」の添加量変更あり 2～20mL/500mL

- ・アズノール[®]うがい液 4%: 40mg/mL, 10 プッシュ/mL, 50 滴/mL
- ・キシロカイン[®]液「4%」: 40mg/mL

・日本病院薬剤師会監修: 病院薬局製剤実例集, p91-92, 薬事日報社, 2013

【注意】本含嗽液について, 当センターでは「ツンゲン・ワッサー」と呼んでいる

「ツンゲン・ワッサー」の使い方

1 はじめに

この青色のお薬は、痛み・炎症止めを含むうがい薬です。口内炎における痛み、炎症等の治療に用いるもので、当センター薬局にて調製しております。

この説明書を良くお読みになってから、お使い下さい。

2 使い方

- ① 口の中をすすいできれいにして下さい

(このうがい薬は、主に**食前**、**寝る前**に用います)



- ② 1日3回から6回（医師・歯科医師の指示通り）、1回当たり、**10mL**（計量カップ）を口に含んで下さい（口の中がピリピリした感覚になることがあります）



- ③ 出来るだけ長くブクブクうがいを繰り返し、吐き出して下さい

3 注意事項

- ① 医師・歯科医師から指示された回数を必ず守って下さい
- ② 使用直前に、容器を十分に振って下さい
- ③ 薄めずに使用して下さい
- ④ うがい後、10分程度は飲食を避けた方が良いです
- ⑤ 光を避けて、必ず冷蔵庫に保管して下さい
- ⑥ このお薬はもらってから**1ヶ月以内**に使い切って下さい
- ⑦ お気付きの点がございましたら、医師・歯科医師、薬剤師に御相談下さい

「ツンゲン・ワッサー」の使い方

1 はじめに

この青色のお薬は、痛み・炎症止めを含むうがい薬です。口内炎における痛み、炎症等の治療に用いるもので、当センター薬局にて調製しております。

この説明書を良くお読みになってから、お使い下さい。

2 使い方

- ① 口の中をすすいできれいにして下さい

(このうがい薬は、主に**食前**、**寝る前**に用います)



- ② 1日3回から6回（医師・歯科医師の指示通り）、1回当たり、**10mL**（計量カップ）を口に含んで下さい（口の中がピリピリした感覚になることがあります）



- ③ 出来るだけ長くブクブクうがいを繰り返し、吐き出して下さい

3 注意事項

- ① 医師・歯科医師から指示された回数を必ず守って下さい
- ② 使用直前に、容器を十分に振って下さい
- ③ 薄めずに使用して下さい
- ④ うがい後、10分程度は飲食を避けた方が良いです
- ⑤ 光を避けて、必ず冷蔵庫に保管して下さい
- ⑥ このお薬はもらってから**1ヶ月以内**に使い切って下さい
- ⑦ お気付きの点がございましたら、医師・歯科医師、薬剤師に御相談下さい