

【超重要・嚴重注意】“クラリスロマイシン(CAM)”と併用禁忌の医薬品ラインナップ

成分名 《薬効分類》	代表的医薬品名(先発品)	製剤写真	代表的医薬品名(先発品)	製剤写真	備考
スプレキサント 《催眠・鎮静薬》	ベルソムラ錠15mg 【注】結構服用している		ベルソムラ錠20mg 【注】結構服用している		・ベルソムラ錠10mg ※後発品なし
チカグレロル 《抗血栓薬》	ブリリント錠60mg		ブリリント錠90mg		※後発品なし
イブプラジン塩酸塩 《心不全治療薬 (HCNチャネル遮断薬)》	コララン錠2.5mg		コララン錠5mg		・コララン錠7.5mg ※後発品なし
エルゴタミン酒石酸塩 含有製剤 《片頭痛治療薬》	クリアミン配合錠A1.0 【注】片頭痛時頓用あり		クリアミン配合錠S0.5 【注】片頭痛時頓用あり		※後発品なし
タダラフィル 《肺高血圧症治療薬》	アドシルカ錠20mg		/		※後発品あり 【例】タダラフィル錠20mgAD 「サワイ」 【注】以下のタダラフィル製剤は 併用注意(容量相違) ・ザルティア錠2.5mg, 同5mg ※後発品あり 【例】タダラフィル錠2.5mgZA 「サワイ」, 同5mg ・シアリス錠5mg, 同10mg, 同 20mg ※後発品あり 【例】タダラフィル錠10mgCI 「サワイ」, 同20mg
ラゾーダ塩酸塩 《抗精神病薬/双極性 障害のうつ症状治療薬》	ラゾーダ錠20mg 【注】最近よく見る		ラゾーダ錠40mg 【注】最近よく見る		・ラゾーダ錠60mg, 同80mg ※後発品なし
ロミタピドメシル酸塩 《脂質異常症治療薬 (MTP阻害薬)》	ジャクスタピッドカプセル5mg		ジャクスタピッドカプセル10mg		・ジャクスタピッドカプセル20mg ※後発品なし
イムブルチニブ 《抗腫瘍化学療法薬 (分子標的治療薬)》	イムブルピカカプセル140mg		/		※後発品なし
アナモレリン塩酸塩 《がん悪液質治療薬 (グレリン様作用薬)》	エドルミズ錠50mg		/		※後発品なし
ベネクレクス 《抗腫瘍化学療法薬 (BCL-2阻害薬)》	ベネクレクスタ錠10mg		ベネクレクスタ錠50mg		・ベネクレクスタ錠100mg ※後発品なし 【重要】 用量漸増期は併用禁忌
フィネノン 《非ステロイド型 選択的ミネラルコルチコ イド受容体拮抗薬》	ケレンディア錠10mg		ケレンディア錠20mg		※後発品なし
イサブコナゾニウム 硫酸塩 《アゾール系抗真菌薬》	クレセンバカプセル100mg		/		※後発品なし
コルヒチン 《痛風治療薬》	【新】コルヒチン錠0.5mg		/		※後発品なし 【重要】 腎障害、肝障害を有する症 例は併用禁忌

【嚴重注意】CAMは上記以外に併用注意の医薬品が非常に多数存在するため、薬物間相互作用を必ず薬剤師に確認する