

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|------------------|----------|------------------------------|--------------|--------|----|
| BV+CapeOX | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | day1 | 21日間 | |
| | オキサリプラチン | 130mg/m ² | day1 | | |
| | カペシタビン | 2000mg/m ² /day | day1夕-day15朝 | | |
| BV+FOLFIRI | ベバシズマブ | 5mg/kg | day1 | 14日間 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | day1 | | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | day1 | | |
| BV+FOLFOXIRI | ベバシズマブ | 5mg/kg | day1 | 14日間 | |
| | イリノテカン | 165mg/m ² | day1 | | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 3200mg/m ² | day1 | | |
| BV+IRIS | ベバシズマブ | 5mg/kg | day1,15 | 28日間 | |
| | イリノテカン | 100mg/m ² | day1,15 | | |
| | S-1 | 80mg/m ² /day | day1夕-day15朝 | | |
| BV+mFOLFOX6 | ベバシズマブ | 5mg/kg | day1 | 14日間 | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | day1 | | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | day1 | | |
| BV+SOX | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | day1 | 21日間 | |
| | オキサリプラチン | 130mg/m ² | day1 | | |
| | S-1 | 80mg/m ² /day | day1夕-day15朝 | | |
| BV+ロンサーフ | ベバシズマブ | 5mg/kg | day1,15 | 28日間 | |
| | TAS-102 | 70mg/m ² /day | day1-5,8-12 | | |
| CapeOX | オキサリプラチン | 130mg/m ² | day1 | 21日間 | |
| | カペシタビン | 2000mg/m ² /day | day1夕-day15朝 | | |
| C-mab+ブラフトビ | セツキシマブ | 250mg/m ² (初回400m | day1 | 7日間 | |
| | エンコラフェニブ | 300mg/day | day1-7 | | |
| C-mab+ブラフトビ+メクトビ | セツキシマブ | 250mg/m ² (初回400m | day1 | 7日間 | |
| | エンコラフェニブ | 300mg/day | day1-7 | | |
| | ビニメチニブ | 90mg/day | day1-7 | | |
| FOLFIRI | イリノテカン | 150mg/m ² | day1 | 14日間 | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | day1 | | |
| HP | ペルツズマブ | 420mg/body(初回84 | day1 | 21日間 | |
| | トラスツズマブ | 6mg/kg(初回8mg/kg | day1 | | |
| IRIS | イリノテカン | 125mg/m ² | day1,15 | 28日間 | |
| | S-1 | 80mg/m ² /day | day1夕-day15朝 | | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | day1 | | |
| mFOLFOX6 | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | 14日間 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | day1 | | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | day1 | | |
| RAM+FOLFIRI | ラムシルマブ | 8mg/kg | day1 | 14日間 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | day1 | | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | day1 | | |
| sLV5FU | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | 14日間 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | day1 | | |
| SOX | オキサリプラチン | 130mg/m ² | day1 | 21日間 | |
| | S-1 | 80mg/m ² /day | day1夕-day15朝 | | |
| パニツムマブ | パニツムマブ | 6mg/kg | day1 | 14日間 | |
| パニツムマブ+CPT-11 | パニツムマブ | 6mg/kg | day1 | 14日間 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | day1 | | |
| パニツムマブ+FOLFIRI | パニツムマブ | 6mg/kg | day1 | 14日間 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | day1 | | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | day1 | | |
| パニツムマブ+mFOLFOX6 | パニツムマブ | 6mg/kg | day1 | 14日間 | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | day1 | | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | day1 | | |