

顔面神経麻痺で入院された患者様へ

患者氏名 @PATIENTNAME 殿(I D : @PATIENTID) 生年月日 : @PATIENTBIRTH2 性別 : @PATIENTSEXX 説明日 : 説明者 :

	入院当日・2日目 (入院2週目の第1・2日目)	3日目以降から6日目 (入院2週目の3日目から6日目)	7日目 (入院2週目の第7日目)	退院(入院14日目以降)
食事	<ul style="list-style-type: none"> ・常食が出ます。(ご希望により食事形態を変更できます。ご希望があればお申し出ください。) ※1 : 食事療法が必要と判断された方は医師の指示により食事内容が変更される場合があります。 ※2 : 食物アレルギーがある方はお申し出ください。 			<ul style="list-style-type: none"> ・朝食までの提供になります。 ・退院後の食事は必要エネルギーや栄養素を摂取できるように心がけてください。
安静	外出・外泊は感染のリスクを考慮して基本的にはご遠慮いただいております。			<ul style="list-style-type: none"> ・心身共にストレスをかけないように段階的に体を慣らすように心がけてください。
検査	<ul style="list-style-type: none"> ・採血、レントゲンなどの検査がある場合、前日にお知らせいたします。 ・血圧、体温を検温時に測定します。検温は1日3回(6時頃、10時頃、19時頃)あります。起床時に体重測定を行います。 ・耳鼻科診察室で8:30頃より診察を行います。(祝日、週末は診察時刻が異なります。) 			
内服	<ul style="list-style-type: none"> ・常用薬は医師、看護師、薬剤師が確認をします。薬剤によっては休薬する場合があります。 ・ステロイド点滴による副作用予防として胃薬を夕食後に内服します。 眠れない時は睡眠導入剤の使用や、便秘の場合は、排便を促す薬剤の使用ができます。いずれの場合も医師、看護師、薬剤師にお申し出ください。			<ul style="list-style-type: none"> ・入院時休薬した常用薬は医師の指示で再開をします。 ・退院処方として追加で内服薬をお渡しすることがあります。
点滴	<ul style="list-style-type: none"> ・10時頃から点滴を行います。約4～5時間程です。点滴の血管外漏の場合は点滴針の周囲の腫れ、痛み、赤みを伴います。その様な症状がありましたら、ナースコールを押してください。 			<ul style="list-style-type: none"> ・退院日は朝6時頃から点滴を開始し、10時頃には終了するようにします。終了次第抜針します。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・入院時必要な書類を確認します。 ・病棟案内をします。 ・シャワーはできません。体を拭くタオルをご利用ください。 ・顔面マッサージを行います。方法、回数については看護師より説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・シャワーの使用ができます。時刻については、当日の午前中に看護師よりお伝えいたします。 		<ul style="list-style-type: none"> ・顔面麻痺の治癒過程など不安な事は医師または看護師に相談してください。 ・退院後も顔面マッサージ継続してください。

状況に応じて予定が変更になる場合があります。ご不明な点などありましたら、お気軽にお尋ねください。

東京歯科大学市川総合病院 2021.08改正