

ヘマンジオルシロップ内服開始・増量を行われる患者様・ご家族様へ

患者氏名 @PATIENTNAME 様 (ID : @PATIENTID) 生年月日 : @PATIENTBIRTH 性別 : @PATIENTSEXN 説明日 : 説明者 :

日時	入院当日 / ()		退院日 / ()	
	内服前	1回目内服	2回目内服	2回目内服後4時間以降
食事	試験当日の朝食は通常通りの食事・哺乳で構いません。	昼12時頃に食事・哺乳して頂きます。	朝9時頃に食事・哺乳して頂きます。	通常通りの食事・哺乳で構いません。
安静	普段通りお過ごしください。	内服後4時間はベッド上でお過ごしください。4時間経過し問題なければプレイルームも使用していただけます。		2回目内服後、問題なければ退院となります。
検査	 心電図、酸素飽和度モニターを装着します。			
内服	すでにヘマンジオルシロップを内服している場合、入院日の朝は内服させずに来院してください。	12時の食事・哺乳直後に1回目の内服をしていただきます。	9時の食事・哺乳直後に2回目の内服をしていただきます。	退院後の夕方以降、1日2回(朝・夕)の食事・哺乳直後に内服して下さい。
点滴	点滴はありません。			
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・体調不良(咳、鼻水、発熱、嘔吐、下痢など)がある際は、看護師にお伝え下さい。 ・入院時に身長、体重、体温、血圧などを測定します。 ・1日の流れや病棟のご案内をします。 ・薬剤内服の指導を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・内服開始から内服後4時間までこまめに症状、血圧、血糖などの観察を行います。 ・副作用症状出現時は必要な内服、注射、検査などを行います。 ・顔色や唇の色が悪い、喘鳴、嘔吐、ぐったりしているなどに気が付きましたら、近くの医療者またはナースコールでお知らせください。 		<ul style="list-style-type: none"> ・退院は14時頃となります。書類や会計の説明がありますのでお部屋でお待ち下さい。 

状況に応じて予定が変更になる場合がございます。ご不明な点などありましたら、お気軽にお尋ね下さい。

東京歯科大学市川総合病院

2022.08.10